

Apiosporina (=Dibotryon) morbosa

Nodule noir du cerisier



Champignons photographiés le 30 mai 2010 dans une forêt mixte, à Saint-Eugène-de-Guigues, en Abitibi-Témiscamingue.

Espèce : *Apiosporina (=Dibotryon) morbosa* / Nodule noir du cerisier

Groupe : Ascomycètes

Date : 30 mai 2010


Lieu : Saint-Eugène-de-Guigues, Abitibi-Témiscamingue

Habitat/substrat : branches de merisier vivant, debout.

Descr. espèce photo. : grégaire, noir, couvert de poils hirsutes, de nodules et de renflements noirs, coriace, apparence charbonneuse, 5 à 8,5 cm de longueur, 1,5 à 2,5 cm de diam; saveur et odeur non observées. Sporée non observée.

Cette espèce est très commune en Abitibi-Témiscamingue.

Des spécimens séchés de cette espèce figurent dans la mycothèque de Patrick Poitras.



BIBLIOTHÈQUE

Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Mise en garde

La bibliothèque du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a obtenu l'autorisation de l'auteur de ce document afin de diffuser, dans un but non lucratif, une copie de son œuvre dans Depositum, site d'archives numériques, gratuit et accessible à tous.

L'auteur conserve néanmoins ses droits de propriété intellectuelle, dont son droit d'auteur, sur cette œuvre. Il est donc interdit de reproduire ou de publier en totalité ou en partie ce document sans l'autorisation de l'auteur.

Warning

The library of the Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue and the Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue obtained the permission of the author to use a copy of this document for non-profit purposes in order to put it in the open archives Depositum, which is free and accessible to all.

The author retains ownership of the copyright on this document. Neither the whole document, nor substantial extracts from it, may be printed or otherwise reproduced without the author's permission.